DOLPEDIA®
ein Service von Dolp Medical

www.dolpedia.de

Ablaufschema Medikamentengabe über die Ernährungssonde

Zufuhr der Sondennahrung stoppen

↓

Ernährungssonde mit 20-40 ml Flüssigkeit spülen
(frisches Leitungswasser mit Trinkwasserqualität bzw. Trinkwasser oder stilles Mineralwasser)

↓

Medikamente vorbereiten und EINZELN über die Ernährungssonde verabreichen.
Zwischen der Verabreichung der verschiedenen Medikamente die Sonde immer mit 5-10 ml Wasser spülen.

Feste Medikamente

Kapseln	Tabletten, Filmtabletten	lösliche Tabletten	Brausetabletten
öffnen, ggf. mörsern und in 15-30 ml Wasser auflösen	mörsern und in 15-30 ml Wasser auflösen	in 15-30 ml Wasser auflösen	in 30-50 ml Wasser auflösen

Flüssige Medikamente

Suspensionen	Tropfen
gut schütteln und mind. 1:1 mit Wasser verdünnen	mind. 1:1 mit Wasser verdünnen

↓

Ernährungssonde mit 20-40 ml Flüssigkeit spülen

↓

Sondenernährung pausieren oder fortführen