

Desinfektionsplan

Ausbruchsfall



ALTENHEIM
FRIEDRICHSBURG gGMBH

	WAS	WANN	WOMIT	KONZENTRATION / EINWIRKZEIT	WIE	WER
Räumliche Unterbringung	Räumliche Unterbringung	<ul style="list-style-type: none"> Isolierung bei bestätigter Erkrankung bzw. Verdacht während der akuten Phase (Durchfall). 			Einzelunterbringung in einem Zimmer mit Nasszelle möglich. Kohortenisolierung möglich.	
 Haut & Hände Desinfektion	Händedesinfektion hygienisch	<ul style="list-style-type: none"> Vor und nach Bewohnerkontakt. Nach Kontakt mit (potentiell) infektiösen Materialien. Nach Kontakt mit der unmittelbaren Bewohnerumgebung. Nach jedem Ablegen von Schutzhandschuhen. Vor aseptischen Arbeiten, wie z. B. Vorbereitung von Medikamenten und Infusionen. Vor Verlassen des Zimmers. 	ASEPTOMAN® PRO	konz. 30 Sek.	Ausreichende Menge Desinfektionsmittel in die hohlen, trockenen Hände geben. Hände während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Hierbei insbesondere Fingerspitzen, Daumen und Nagelfalze berücksichtigen und ggf. portionsweise erneut Produkt aufbringen.	Alle Mitarbeitenden
			ASEPTOMAN® FORTE (bei erforderlicher viruzider Wirksamkeit)	konz. 30 Sek.		
 Haut & Hände Reinigung	Händewaschung bei Clostridioides (früher Clostridium) difficile	<ul style="list-style-type: none"> Nach jeder Händedesinfektion zur mechanischen Beseitigung bakterieller Sporen! 	Tapira Top Waschlotion Sensitive		Waschlotion aus dem Spender mit lauwarmen Wasser aufschäumen. Hände gründlich abspülen und sorgfältig mit weichen Einmalhandtüchern abtrocknen. Dabei besonders die Fingerzwischenräume beachten.	Alle Mitarbeitenden
 Flächen	Kontaktflächen von am Bewohner benutzten med./tech. Geräten und Pflegeutensilien	<ul style="list-style-type: none"> Sofort nach Gebrauch sowie vor dem Entfernen aus dem Zimmer. 	ULTRASOL OXY® WIPES	konz. 5 Min.	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen. Ggf. Herstellerangaben zur Aufbereitung beachten.	Mitarbeitende in der Pflege
	Bewohnernahe Kontaktflächen z. B. Nachttisch, Bettgestell, Griffe, Türklinen, Rollstuhl, Toilettenstuhl, Matratzenschonbezug	<ul style="list-style-type: none"> Täglich. Direkt bei Kontamination. Flächendesinfektion erfolgt am Ende eines Durchgangs. 	ULTRASOL OXY® WIPES	konz. 5 Min.	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Mitarbeitende in der Pflege Mitarbeitende in der Reinigung
	Inventar z. B. Küchenarbeitsflächen und Handgriffe, Tische, Stühle, Handläufe	<ul style="list-style-type: none"> Täglich. Direkt bei Kontamination. Flächendesinfektion erfolgt am Ende eines Durchgangs. 	ULTRASOL OXY® WIPES	konz. 5 Min.	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Mitarbeitende in der Pflege Mitarbeitende in der Reinigung
	Sanitärbereich	<ul style="list-style-type: none"> Täglich. Direkt bei Kontamination. Flächendesinfektion erfolgt am Ende eines Durchgangs. 	ULTRASOL OXY® WIPES	konz. 5 Min.	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Mitarbeitende in der Pflege Mitarbeitende in der Reinigung
	Fußboden	<ul style="list-style-type: none"> Täglich. Direkt bei Kontamination. Flächendesinfektion erfolgt am Ende eines Durchgangs. 	ULTRASOL OXY® WIPES (nur für kleine Flächen)	konz. 5 Min.	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Mitarbeitende in der Pflege Mitarbeitende in der Reinigung
	Abfallbehälter	<ul style="list-style-type: none"> Direkt bei 	ULTRASOL OXY® WIPES	konz. 5 Min.	Flächen vollständig	Mitarbeitende in der

Desinfektionsplan

Ausbruchsfall



ALTENHEIM
FRIEDRICHSBURG gGBH

WAS	WANN	WOMIT	KONZENTRATION / EINWIRKZEIT	WIE	WER
	<ul style="list-style-type: none"> Kontamination. Abfall täglich entsorgen. 			benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen. Spitze, scharfe und zerbrechliche Gegenstände nur sicher umschlossen in den Abfall geben. Abfallschlüssel und Verordnung der Länder einhalten.	Pflege Mitarbeitende in der Reinigung
Sonstiges	Schutzkleidung	<ul style="list-style-type: none"> Geeigneter Schutzkittel (DIN EN 14126) mit gut abschließendem Bündchen, flüssigkeitsdicht und strapazierfähig, die Körpervorderseite des Trägers bedeckend, wenn mit Kontamination, Durchfeuchtung der Arme und Arbeitskleidung zu rechnen ist. Ggf zusätzlich flüssigkeitsdichte Schutzschürze. Geeigneter Atemschutz (FFP2-Maske) grundsätzlich bei Influenza und Coronavirus (SARS-CoV-2): Vor bzw. beim Betreten des Zimmers. Risikobewertung durchführen. Mund-Nasen-Schutz: Bei möglichem Kontakt mit Aerosolen, zum Schutz vor der Berührung von Mund und Nase mit kontaminierten Händen. Einmalhandschuhe: Vor direktem Bewohnerkontakt. Vor möglichem Kontakt mit (potentiell) kontaminierten Material, Gegenständen, Geräten, Instrumenten. Ggf. Augen-/ Gesichtsschutz: Wenn die Gefahr einer Kontamination der Augenschleimhäute besteht. 		Schutzkleidung über die Arbeitskleidung anziehen. Vor Verlassen des Zimmers ablegen und in einem geschlossenen Abfallbehälter entsorgen.	Alle Mitarbeitenden
	Geschirr	<ul style="list-style-type: none"> Sofort nach Gebrauch. Geschirr steht nicht unbeaufsichtigt im Wohnbereich. 		Geschirr unverzüglich zur Spülmaschine transportieren, ggf. Nutzung eines geschlossenen Behälters. Routinemäßig reinigen. Maschinell bei mind. 65°C.	Mitarbeitende in der Pflege Mitarbeitende in der Reinigung

Bei behördlich angeordneten Desinfektionsmaßnahmen auf Grund meldepflichtiger, übertragbarer Krankheiten (§18 IfSG) sind Mittel und Verfahren aus der Desinfektionsmittelliste des Robert Koch-Institutes anzuwenden. Desinfektionslösungen sind immer mit kaltem Wasser anzusetzen. Die Angaben der Hersteller sind zu beachten. Schutzhandschuhe tragen. Eine Risikobewertung und Einstufung der aufzubereitenden Medizinprodukte ist durchzuführen. Nach Abklingen der Symptome sind besondere Hygienemaßnahmen ggf. über einen gewissen Zeitraum beizubehalten. Informationen an alle Beteiligten wie Pflegemitarbeiter, Betreuungspersonal, Reinigungspersonal, Ärzte, Besucher weiterleiten und hygienische Maßnahmen überwachen. Dieser Desinfektionsplan ist auf Basis der TRBA 250 erstellt. Die Prüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit liegt beim Anwender.

Datum / erstellt, geprüft und freigegeben
Stand: 10.01.2025, Revision: 0